

一代交配



ネオ・スパイラル

(NX-CL322)

ロマネスコ


特 性

- ① 秋冬どりで定植後90日程度、春どりでは定植後65～70日程度で収穫できる。
- ② 花蕾は幾何学的形状で、鮮やかな黄緑色となる。
- ③ 草勢は旺盛で、草姿は半立性。
- ④ 耐暑性に優れ、高温による生理障害の発生や花蕾頂の変形が少ない。



生育の比較

スパイラルとうまく組合せて栽培すると
リレー出荷ができる!



ネオ・スパイラル


スパイラル

秋冬どり(定植後90日) 2014年11月25日撮影

栽培のポイント

- 秋冬どり : 遅蒔きすると低温によるアントシアンが発生することがあるため、極端な遅まきは避ける。
- 春～初夏どり: 茎葉の生育と花蕾形成が同時に進行するため、苗の老化や植え傷みを防ぐ。

栽培の目安



● 播種 --- 育苗 ▼ 定植 — 生育 ■ 収穫 (トンネル)

- ※ 作型表はあくまでも目安です。実際には貴地の気候に応じて栽培して下さい。
- ※ 収穫物の写真は、実際に収穫される野菜が写真のように完全に再現されることを保証するものではありません。

メモ

野菜づくりは品種がきめて!!



渡辺農事株式会社

千葉県野田市柳沢13番地 www.watanabenoji.com



一般社団法人
日本種苗協会
会員番号 12-041号

国産の消費拡大に向けた国民運動

