

産地便り

渡辺交配 ふゆみさき **冬岬 (NX-BR862) New!** ~ダイコンの産地栽培事例と特性について~

2007年秋の状況

2007年の秋は、8月の高温乾燥、9月の異常高温と台風9号の影響で、ダイコン栽培が非常に困難でした。苦労して作った品物には、高温障害やキスジノミハムシとシンクイムシなどの虫害が発生した上に播種時期の集中に伴う安値に見舞われ、生産者の方々にとって大変苦しいシーズンでした。

しかし一方では、中国産の野菜や加工食品の問題が多くとりざたされ国産野菜への需要が高まりを見せています。このような中でダイコン産地からはより一層の「揃い」、「肌質」、「尻の詰りの良さ」をもつ品種が求められております。この要望に応え昨年に続き国内産地で高い評価を得た「冬岬」ダイコンをご紹介します。

冬岬の特徴

- ① 揃いがよく、尻の詰りに優れる。
- ② 肌の障害に強く、上品な肌の白さと光沢がある。
- ③ 首もとの汚れが少なく、短根になりにくい。
- ④ 葉は旺盛タイプだが、曲がりが少ない。
- ⑤ 無理な早蒔きは、長くなりすぎ曲がりの原因となるので避けること。



産地栽培事例の紹介

~千葉県銚子地区~



箱詰め前の 冬岬



肌が強く、光沢があり、尻の詰りも良い

①② 千葉県銚子市東部地区

播種：2007年 9月26日
収穫：2007年 12月20日
栽培：露地栽培
株間：24cm

<評価>

冬岬は「揃い」「上品な肌質」の他に、首もとの汚れが少なく、肩が張り過ぎないので箱詰めしやすい。銚子地区では9月中旬~9月下旬播種まで使える。



他社品種 F種 冬岬



揃いが抜群の 冬岬

③④ 千葉県銚子市小浜地区

播種：2006年 9月22日
収穫：2006年 12月21日
栽培：露地栽培
株間：24cm

<評価>

肌質が滑らかで光沢がある。漬物にした時の漬け上がりと味が最高。

~千葉県銚子地区~



冬岬 他社種




冬岬

⑤⑥ 千葉県旭市海上地区

播種：2007年 9月23日
収穫：2007年 12月20日
栽培：露地栽培
株間：24cm

<評価>

「揃い」と「尻の詰り」が良かった他に、洗った後の「肌の白さと強さ」が目立った。



⑦⑧ 千葉県銚子市八木地区

播種：2007年 10月 5日
収穫：2008年 1月23日
栽培：ハウス栽培
株間：24cm

<評価>

ハウスで栽培したが、他社品種と比べて「首コケ」がなく、「揃い」と「尻の詰り」が非常に良かった。葉が旺盛なわりに曲がりも少なく10月上旬播種のハウス栽培でも高評価。

~千葉県袖ヶ浦地区~



⑨ 千葉県袖ヶ浦市

播種：2007年 9月28日
収穫：2008年 1月16日
栽培：露地栽培
条間×株間：55×22cm

⑩ 千葉県袖ヶ浦市

播種：2007年 9月27日
収穫：2008年 1月28日
栽培：露地栽培
条間×株間：60×25cm

<評価>

他社F種と比べ、尻詰まり良く、根形のバランスよく、肌も綺麗で気に入った。ス入りもないので12月~1月出荷で使っていく。

~千葉県八街市上砂地区~

千葉県八街市上砂地区

播種：2007年 9月14日
収穫：2007年 11月29日
栽培：露地栽培
株間：25cm

<評価>

他社品種より冬岬は肩が張りすぎず箱詰めしやすかった。他社種より胴の張りよく尻コケせず、短根になりやすい。来年は9月中旬播種で導入したい。

~神奈川県三浦市~



⑪ 神奈川県三浦市初声町下宮田

播種：2007年 9月27日 栽培：露地栽培
収穫：2008年 1月31日 畝間×株間：45×25cm

<評価>

揃いと尻の詰りが良い。肩が張りすぎず、肌も滑らかでみずみずしい。耐寒性があるので三浦市中部~北部に適す。

~青森県下田地区~



⑫ 青森県下田地区

播種：2007年 8月20日
収穫：2007年 10月30日
栽培：露地栽培
株間：25cm

<評価>

他社品種より冬岬は肩が張りすぎず、揃いが良く、短根になりやすい。暖冬のおかげもあるが、青森南部地区の8月盆明け播種で使えるのではないかと。