

夏季栽培でも抜群の秀品率を誇る  
3季蒔き品種、新登場!

# ニイハオ・メイ

**新発売** (NX-BP180) チンゲンサイ

全国的に夏の暑さは年を追うごとに厳しさを増し、それに伴い品種に求められる特性も変化してきました。チンゲンサイでは、今まで以上に高温障害の発生が少なく、高い歩留まりを確保できる品種が求められている中で、「ニイハオ・メイ」が試作産地で高い評価を得ました。



## 「ニイハオ・メイ」が高評価を得た3つのポイント

播種:4月4日、定植:4月27日~4月29日、調査:5月30日、ハウス+黒マルチ栽培  
場所:JA広島北部 有馬農園様圃場

### ①ズッシリ重い、抜群の重量感!


寸胴型で見た目はコンパクトだが、他社品種より葉柄の厚みがあり、葉枚数が多い。調整作業後の1株重が重く、高い歩留まりを確保することができた。



「ニイハオ・メイ」 他社品種

### ②収穫作業、出荷調整作業が楽!

尻部が平滑のため、収穫時に切りやすい。葉枚数が多く、調整作業も容易。また草姿立性のため、出荷袋への梱包作業も手間が掛からなかった。



「ニイハオ・メイ」 他社品種  
左:尻部の平滑な「ニイハオ・メイ」

### ③栽培適期が長く、生理障害や病害の発生が極少ない

夏用品種としては抽苔が遅く、春播きから秋播きまで幅広く使用できた。白さび病、黒腐病などの重要病害の発生もなかった。また、夏季の栽培でも節間伸長、カップングなどの高温障害が少なかった。



夏用品種としては抽苔が遅く、春播きから使用できます。

春播き~秋播きまで、幅広い播種時期が魅力です!

夏季の栽培でも節間伸長、カップングなどの高温障害が少ない品種です。

中間地・ハウス	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月
播種期		■	■	■	■	■	■		
収穫期			■	■	■	■	■	■	■

■ : 播種期 ■ : 収穫期

推奨播種時期(中間地・ハウス栽培):3月下旬~9月下旬

春、夏、秋の栽培品種は「ニイハオ・メイ」におまかせ下さい!